



ENNENAIKAISEN SIEMENSYÖKSYN DIAGNOSTINEN KYSELY (PEDT)

Epävirallinen suomenkielinen käännös kliniseen käyttöön

Tämä kysely auttaa tunnistamaan miehiä, joilla saattaa olla ongelmia liian aikaisen siemensyöksyn kanssa seksuaalisen kanssakäymisen aikana. Vastaa kaikkiin kysymyksiin yleisen kokemuksesi perusteella.

Huomio: Siemensyöksyllä tarkoitetaan siemennesteen laukeamista penetraation jälkeen.

1. Kuinka vaikeaa sinun on viivästyttää siemensyöksyä?

Ei lainkaan vaikeaa (0)
Hieman vaikeaa (1)
Kohtalaisen vaikeaa (2)
Hyvin vaikeaa (3)
Erittäin vaikeaa (4)

2. Laukeatko ennen kuin haluaisit?

Ei koskaan/lähes ei koskaan (0)
Harvemmin kuin puolessa kerroista (1)
Noin puolessa kerroista (2)
Yli puolessa kerroista (3)
Aina/lähes aina (4)

3. Laukeatko hyvin vähäisen stimulaation seurauksena?

Ei koskaan/lähes ei koskaan (0)
Harvemmin kuin puolessa kerroista (1)
Noin puolessa kerroista (2)
Yli puolessa kerroista (3)
Aina/lähes aina (4)

4. Tunnetko turhautumista siitä, että laukeat ennen kuin haluaisit?

Ei lainkaan (0)
Hieman (1)
Kohtalaisesti (2)
Hyvin paljon (3)
Erittäin paljon (4)

5. Kuinka huolissasi olet siitä, että lyhyt aika siemensyöksyyn jättää partnerisi seksuaalisesti tyydyttymättömäksi?

Ei lainkaan huolissaan (0)
Hieman huolissaan (1)
Kohtalaisesti huolissaan (2)
Hyvin huolissaan (3)
Erittäin huolissaan (4)

Tulkinta

- ≥11 pistettä: viittaa vahvasti ennenaikaiseen siemensyöksyyn (PE)
- 9–10 pistettä: rajatapaus / mahdollinen PE
- ≤8 pistettä: PE epätodennäköinen

Alkuperäinen viite:

Symonds T, Perelman MA, Althof S, et al.
Development and validation of a premature ejaculation diagnostic tool.
 European Urology. 2007;52(2):565–573.

Tämä dokumentti on epävirallinen suomenkielinen käännös alkuperäisestä PEDT-kyselystä. Ei virallinen validoitu suomenkielinen tutkimusversio.